

Taxonomía

Reino	Phylum	Clase	Orden	Familia
Plantae	Spermatophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae

Nombre Taxon:	<i>Arenaria erinacea</i>	Boiss.
---------------	--------------------------	--------

Evaluación

Propuesta catálogo Categoría: **VU**

Categorías de protección previas:

CEANA	LESPE/CEA	Directiva Hábitats, Aves	Libro rojo (UICN)	UICN Mundial	BERNA	CONBONN

Resumen y justificación de la propuesta:

Se trata de un endemismo de la Península Ibérica, con presencia muy escasa en Navarra. Únicamente se conoce de la sierra de Codés, donde se encuentra en pastizales crioturbados de la zona cumbreña de Costalera y Peña Gallet (Berastegi 2013).

Aunque no se han llevado a cabo censos específicos sobre la especie, su pequeña área de presencia y los requerimientos ecológicos específicos sugieren la conveniencia de proponer, al menos, la categoría de Vulnerable.

Criterio A: Tendencia del tamaño poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio B: Tendencia del área de distribución

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio C: Viabilidad Poblacional

Este criterio no es de aplicación en este taxon.

Criterio D: Criterio experto

Se trata de un endemismo de la Península Ibérica, con presencia muy escasa en Navarra. Únicamente se conoce de la sierra de Codés, donde se encuentra en pastizales crioturbados de la zona cumbreña de Costalera y Peña Gallet (Berastegi 2013, Villar et al. 1995).

Aunque no se han llevado a cabo censos específicos sobre la especie, su pequeña área de presencia y los requerimientos ecológicos tan específicos sugieren la conveniencia de proponer, al menos, la categoría de "vulnerable".

Consideraciones respecto a poblaciones próximas:

Consideraciones respecto a poblaciones fragmentadas:

Población:

Tamaño Poblacional:

Una localidad conocida en la sierra de Codés.

Evolución temporal de la población:

Se desconoce.

Distribución:

Distribución Mundial:

Orófito mediterráneo. Endemismo de la Península Ibérica.

Distribución España:

Presente en la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico principalmente, con localidades aisladas en Pirineos, Sistema Central y sierras del sur de la Península Ibérica.

Distribución Navarra:

Presente en las montañas de la Navarra media oriental (sierra de Codés).

Datos cuantitativos sobre la evolución de distribución:

Se desconoce.

Viabilidad Poblacional:

Se desconoce.

Hábitat y Ecología

Crestones pedregosos venteados, sobre suelos crioturbados (*Festuco-Poetalia ligulatae*)

FormaBio: caméfito ; FenoFlor: V-VII

Amenazas

Créditos

Autor: Asun Berastegi Gartzandia

Bibliografía

Aseginolaza, C., Gómez, D., Lizaur, X., Monserrat, G., Morante, G., Salaberría, M.R. y Uribe-Echebarría, P.M.(1984): Catálogo Florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.. Gobierno Vasco. 1149 pp.

Berastegi, A.(2013): Pastizales y prados en Navarra: descripción, tipificación y ecología. Guineana. 19:1-510

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA(2017): Base de datos georreferenciada para el registro de la monitorización de las especies de flora amenazada y de interés en Navarra. Gobierno de Navarra & Gestión Ambiental de Navarra.. Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen Kudeaketa.

Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D. y Goñi, D.(1995): Bases técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra. Informe inédito. Gob. Navarra. IPE Jaca..